

FRELON ASIATIQUE.....DANGER !

Le frelon asiatique (*Vespa Velituna Nigrithorax*) originaire des pays asiatiques (*Inde Chine Indonésie*) a été découvert dans le sud de la France en 2004. Depuis il s'est largement propagé en Europe du Sud et du Nord.

Cet hyménoptère construit un nid en début d'année (février mars avril) au sommet des arbres, sous les toitures, dans des buissons ou des haies. Ce nid est de la taille d'un ballon de football et peut contenir jusque 2000 individus.

Cette espèce envahissante est un prédateur redoutable des abeilles dont il nourrit ses larves mais s'avère aussi dangereuse pour l'homme.

Pour les abeilles, son vol stationnaire devant les ruches lui permet de se saisir d'une abeille en plein vol mais il peut aussi décimer une colonie entière en cas d'attaque groupée.

Pour l'homme, le frelon asiatique devient agressif si son nid est menacé et dans ce cas il attaque massivement ; si une piqûre reste douloureuse, plusieurs piqûres peuvent avoir des conséquences dramatiques surtout en cas d'allergies (plusieurs décès ont été recensés)

En cas de découverte d'un nid il ne faut pas intervenir soi-même mais contacter la mairie pour faire appel un professionnel certifié.

Le piègeage du frelon asiatique est conseillé tout au long de l'année mais principalement en début d'année (février mars) afin de capturer les reines fondatrices de colonie. En effet, à l'approche de l'hiver, la colonie meurt progressivement, le nid devient inactif et ne sera plus utilisé. En revanche, à l'automne certaines jeunes reines fécondées vont s'abriter quelques mois (abris, tas de bois, sol) pour créer de nouveaux nids au printemps.

COMMENT LE RECONNAITRE

Abeille



Guêpe



Frelon Asiatique



Abdomen NOIR
2 Stries ORANGE
Pattes JAUNE

Frelon Européen

